

Fear Free

Fármacos Previos a la visita



FÁRMACO	CLASE & ACCIÓN	DOSIS*	EFFECTOS ADVERSOS	PRECAUCIONES	NOTAS
Alprazolam	Ansiolítico Reducción del pánico en humanos	Perro: 0,02-0,1 mg/kg/dosis PO; Gato 0,125-0,25 mg/ GATO (NO/kg) PO; administrada 30-60 min antes del evento	ataxia; excitación paradójica	posible desinhibición conductual	metabolizada por hidroxilación -puede reducir el potencial de toxicidad hepática en gatos; probar la dosis antes del evento
Clonidina	alfa-2 agonista – reduce los efectos noradrenérgicos	Perro: 0,01-0,05 mg/kg/dosis PO; EFICACIA NO ESTABLECIDA EN GATOS; administrar 1 ½ horas antes del evento	sedación; ataxia; constipación	DOSIS/EFICACIA NO ESTABLECIDA EN GATOS	puede ser utilizada en combinación con otros fármacos ansiolíticos
Diacepam	Ansiolítico	Perro: 0,5-2 mg/kg/dosis PO; NO ADMINISTRAR A GATOS POR VÍA ORAL; administrar 30-60 min antes del evento	ataxia; excitación paradójica; puede incrementar la actividad a dosis más altas	posible desinhibición conductual; evitar administrar en gatos por posible hepatotoxicidad	metabolizado rápidamente; respuesta variable entre individuos

*Variabilidad individual: Se recomienda probar la dosis antes de la visita para verificar el momento de inicio de la acción, dosis, efecto, duración del efecto, y posibles efectos adversos, para asegurar que los fármacos puedan ser administrados con suficiente antelación para alcanzar el pico de efectividad en el momento de la visita.

FÁRMACO	CLASE & ACCIÓN	DOSIS*	EFECTOS ADVERSOS	PRECAUCIONES	NOTAS
Gabapentina	Dolor neuropático/ analgesia; calmante/ sedación a dosis altas; disminución de la ansiedad	Perro: 10-40 mg/kg/dosis PO; Gato: 10-20 mg/kg/ dosis o 50- 100 mg/GATO (NO/ kg); administrar 1-2 horas antes del evento	puede intensificar los efectos sedantes de otras drogas		se combina bien con otros fármacos; para máxima sedación administrar una dosis de carga la noche anterior
Loracepam	Ansiolítico	Perro: 0,02-0,1 mg/kg/ dosis PO (hasta 0,5 mg/kg/dosis); Gato 0,25-0,5 mg/GATO (NO/ kg) PO; administrar 45-60 min antes del evento	ataxia; excitación paradójica	posible desinhibición conductual	no metabolitos intermedios activos – más seguro para pacientes con hepatopatías o geriátricos
Trazodona	ansiolítico, sedación	Perro: 3-8 mg/kg/ dosis PO; Gato: 50 mg/ GATO (NO/ kg); administrar 1-2 horas antes del evento	somnolencia; excitación paradójica; leves efectos GI variables; puede causar protrusión del tercer párpado en gatos	utilizar con precaución cuando se combina con fármacos que pueden incrementar la serotonina (IRSSs, ATCs, tramadol, triptófano)	Más de 4 horas de duración; compatible con sedación inyectable & anestesia inhalatoria; mejor administrar con el estómago vacío; para los perros considerar una dosis de carga la noche anterior

*Variabilidad individual: Se recomienda probar la dosis antes de la visita para verificar el momento de inicio de la acción, dosis, efecto, duración del efecto, y posibles efectos adversos, para asegurar que los fármacos puedan ser administrados con suficiente antelación para alcanzar el pico de efectividad en el momento de la visita.

Uso farmacéutico y consentimiento del propietario

No todos los medicamentos de estas tablas están aprobados por la FDA para su uso en perros y gatos. Fármacos como los agonistas alfa-2 se utilizan a menudo en dosis más bajas que las aprobadas por la FDA, ya que no siempre es necesaria una sedación profunda. Sin embargo, todas las dosis en esta tabla se usan comúnmente en la práctica y se mencionan en la literatura veterinaria.

La Política de la AVMA (American Veterinary Medical Association) sobre el consentimiento del propietario establece que los veterinarios o el personal deben proporcionar información suficiente que permita a los propietarios o personas autorizados tomar las decisiones adecuadas al elegir la atención veterinaria proporcionada. Se debe proporcionar una evaluación de los riesgos y beneficios de los tratamientos recomendados. En respuesta, los propietarios o personas autorizados deben indicar:

- Si sus preguntas han sido respondidas satisfactoriamente.
- Si se ha entendido la información recibida por ellos
- Si dan su consentimiento a los tratamientos recomendados

El consentimiento puede ser verbal o escrito y el veterinario o miembro del personal debe documentarlo en el registro médico.

Tomado de la Política de la AVMA sobre el consentimiento del propietario en medicina veterinaria. Se recomienda revisar la política completa aquí: <https://www.avma.org/KB/Policias/Pages/Owner-Consent-in-Veterinary-Medicine.aspx>